


# Calcolo combinatorio

## 1 Cardinalità del prodotto cartesiano

*Teorema:* Se gli insiemi  $A_1, A_2, \dots, A_k$  contengono rispettivamente  $n_1, n_2, \dots, n_k$  oggetti, il numero di modi diversi di scegliere prima un oggetto di  $A_1$ , poi un oggetto di  $A_2$ , e così via, fino a un oggetto di  $A_k$ , cioè la cardinalità del prodotto cartesiano  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$ , è

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

Ciò può essere dimostrato, a livello intuitivo, rappresentando le possibili scelte sotto forma di albero,



nel quale la  $i$ -esima diramazione rappresenta la scelta di un elemento di  $A_i$ , e perciò ha  $n_i$  rami. Ciascuna delle foglie corrisponde allora a un modo di scegliere un elemento da ogni insieme  $A_1, A_2, \dots, A_k$ , e in totale ci sono appunto  $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k = N$  foglie.

## 2 Disposizioni semplici

*Teorema:* Il numero delle **disposizioni semplici** (cioè *senza ripetizione*) di  $k$  oggetti scelti da un insieme di  $n$  oggetti distinti è dato da


$$D_{n,k} = n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

*Nota:* Come caso particolare, se  $k = n$ , si dice che

$$D_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{1} = n!$$

è il numero di **permutazioni** di  $n$  oggetti.

Anche questo teorema può essere dimostrato intuitivamente mediante un albero:



Ogni volta che si sceglie un elemento dell'insieme, cioè a ogni diramazione, questo viene escluso dalle scelte successive, quindi la prossima diramazione avrà un ramo in meno. Allora,

1. alla prima diramazione si hanno  $n$  scelte,
2. alla seconda se ne hanno  $n - 1$ ,
3. alla terza se ne hanno  $n - 2$ ,

e così via, fino alla  $k$ -esima diramazione, per la quale si hanno  $n - k + 1$  scelte. Quindi, applicando il teorema precedente, il numero totale di possibili scelte è

$$n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - k + 1)$$

che può essere scritto anche come

$$\frac{n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - k + 1)(n - k)(n - k - 1) \cdots 1}{(n - k)(n - k - 1) \cdots 1} = \frac{n!}{(n - k)!}$$

### 3 Combinazioni

*Teorema:* Il numero delle **combinazioni** di  $n$  oggetti a gruppi di  $k$  è dato da

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{D_{n,k}}{k!} = \frac{n!}{(n - k)! k!}$$

*Dimostrazione:* Sia  $A$  un insieme di cardinalità  $n$ , cioè i cui elementi possono semplicemente essere indicati con i numeri da 1 a  $n$ :

$$A = \{1, 2, \dots, n\}$$

Da esso, si ricava l'insieme  $B$  delle  $n$ -uple contenenti tutti i suoi elementi:

$$B = \{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \mid \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n \in A, \omega_i \neq \omega_j \forall i \neq j\}$$

In pratica,  $B$  è l'insieme delle permutazioni di  $A$ , e quindi ha cardinalità:

$$\#B = D_{n,n} = n!$$

Al fine di questa dimostrazione, sarà necessario individuare una corrispondenza tra gli elementi di  $B$  e i sottoinsiemi di cardinalità  $k$  dell'insieme  $A$ . Ciò si può fare “dividendo” le  $n$ -uple in due parti, tali che

1. i primi  $k$  elementi sono quelli “scelti” per formare il sottoinsieme,
2. i restanti  $n - k$  (quelli con indici da  $k + 1$  a  $n$ ) sono tutti gli elementi che invece non vengono inclusi,

e trascurando l'ordine degli elementi all'interno di ciascuna delle due parti. A livello formale, queste operazioni vengono eseguite mediante l'introduzione di due relazioni di equivalenza.

La prima relazione di equivalenza,  $\sim_1$ , costruita sull'insieme  $B$ , considera due  $n$ -uple come equivalenti se e solo se la “seconda parte” di entrambe contiene gli stessi elementi, a prescindere dall'ordine. In simboli, dati due elementi  $b_1, b_2 \in B$ , si ha che:

$$b_1 \sim_1 b_2 \iff \{\omega_{k+1}, \dots, \omega_n\}_{b_1} = \{\omega_{k+1}, \dots, \omega_n\}_{b_2}$$

(dove la notazione  $\{\omega_i, \dots, \omega_j\}_b$  indica, appunto, gli elementi dall' $i$ -esimo al  $j$ -esimo della  $n$ -upla  $b$ , considerati senza tenere conto del loro ordine).

Per definizione, gli elementi di una classe di equivalenza di  $\sim_1$  corrispondono alle permutazioni dell'insieme  $\{\omega_{k+1}, \dots, \omega_n\}$ , che ha cardinalità  $n - k$ , perciò la cardinalità di ciascuna classe di equivalenza è:

$$D_{n-k, n-k} = (n - k)!$$

Allora, essendoci  $\#B = n!$  elementi in totale, e  $(n - k)!$  elementi per ogni classe di equivalenza, il numero di classi deve essere:

$$\frac{n!}{(n - k)!}$$

Questa è quindi la cardinalità dell'insieme quoziente  $B/\sim_1$ , che è appunto l'insieme di tutte le classi di equivalenza.

A questo punto, considerando gli elementi rappresentativi delle classi,<sup>1</sup> si introduce su  $B/\sim_1$  la seconda relazione di equivalenza,  $\sim_2$ : essa pone come equivalenti le  $n$ -uple che

---

<sup>1</sup>Assegnare gli elementi rappresentativi alle classi di equivalenza significa definire una corrispondenza biunivoca tra tali elementi e le classi. In questo caso, si può ad esempio scegliere, per ciascuna classe, una qualsiasi delle  $n$ -uple che vi appartengono.

hanno gli stessi elementi, a prescindere dall'ordine, nella "prima parte". Formalmente, se  $b_1, b_2 \in B/\sim_1$ , allora:

$$b_1 \sim_2 b_2 \iff \{\omega_1, \dots, \omega_k\}_{b_1} = \{\omega_1, \dots, \omega_k\}_{b_2}$$

Analogamente a quanto fatto per  $\sim_1$ , si mettono in corrispondenza gli elementi di ciascuna classe di equivalenza di  $\sim_2$  con le permutazioni dell'insieme  $\{\omega_1, \dots, \omega_k\}$ , che sono  $D_{k,k} = k!$ , determinando così che la cardinalità del quoziente di  $\sim_2$  è:

$$\#((B/\sim_1)/\sim_2) = \frac{\#(B/\sim_1)}{k!} = \frac{\frac{n!}{(n-k)!}}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Infine, siccome le due relazioni di equivalenza "eliminano" l'ordine sia dei primi  $k$  elementi delle  $n$ -uple che degli  $n-k$  rimanenti, le  $n$ -uple rappresentative delle classi di  $\sim_2$  possono essere messe in corrispondenza biunivoca con i sottoinsiemi di cardinalità  $k$  dell'insieme  $A$ :

$$\# A = \#((B/\sim_1)/\sim_2) = \frac{n!}{(n-k)!k!} \quad \square$$

## 4 Combinazioni con ripetizione

*Teorema:* Il numero delle **combinazioni con ripetizione** di  $n$  oggetti a gruppi di  $k$  è dato da

$$C_{n+k-1,k} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{D_{n+k-1,k}}{k!} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!k!}$$

*Dimostrazione:* Per prima cosa, si osserva che scegliere  $k$  oggetti da un insieme di  $n$  (in altre parole, scegliere  $k$  oggetti tra oggetti di  $n$  tipi) potendo ripetere le scelte equivale a costruire una sequenza di  $k$  oggetti (rappresentati graficamente come asterischi),

$$\underbrace{*** \cdots *}_{k \text{ oggetti}}$$

nella quale l'appartenenza degli oggetti agli  $n$  tipi disponibili è indicata mediante l'aggiunta di appositi elementi separatori,

$$||| \cdots |$$

Ad esempio, se si vogliono scegliere 5 oggetti da un insieme di 4, una delle possibili sequenze costruite in questo modo è

$$**|*||**$$

che rappresenta la scelta di:

- 2 oggetti del primo tipo;
- 1 oggetto del secondo tipo;
- nessun oggetto del terzo tipo;
- 2 oggetti del quarto tipo.

Per separare  $n$  tipi di oggetti servono  $n - 1$  separatori (uno dopo ogni tipo, tranne l'ultimo, che non ha un tipo successivo da cui deve essere separato). Quindi, le sequenze considerate sono formate complessivamente da  $k + n - 1$  elementi, dei quali, appunto,  $k$  sono oggetti e  $n - 1$  sono separatori. Allora, tutte queste sequenze possono essere enumerate ottenendo prima le permutazioni dei  $k + n - 1$  elementi, che sono  $(k + n - 1)!$ , e poi trascurando, all'interno di esse, i diversi ordini

- dei  $k$  oggetti:  $k!$ ;
- degli  $n - 1$  separatori:  $(n - 1)!$ .

Infatti, data una qualsiasi di queste sequenze, scambiando tra di loro alcuni "asterischi" (oggetti) si ottiene una sequenza indistinguibile a quella di partenza, e lo stesso avviene se si scambiano alcuni separatori (l'unica operazione che invece produce una sequenza diversa è lo scambio di posizione tra un asterisco e un separatore).

Si ricava così che ci sono in totale

$$\frac{(k + n - 1)!}{k!(n - 1)!} = \frac{(n + k - 1)!}{((n + k - 1) - k)!k!} = \binom{n + k - 1}{k} = C_{n+k-1,k}$$

modi per scegliere  $k$  oggetti da un insieme di  $n$ .  $\square$

## 5 Problemi d'esempio

### 5.1 Numeri di 4 cifre

*Problema:* Trovare quanti numeri di 4 cifre possono essere formati con le 10 cifre  $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$ , se

1. si ammettono ripetizioni;
2. *non* si ammettono ripetizioni;
3. l'ultima cifra deve essere 0 e non si ammettono ripetizioni.

*Soluzioni:*

1. Un primo tentativo potrebbe essere

$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4$$

ma ciò conta anche i numeri che iniziano con 0 (ad esempio 0397), e non possono quindi essere considerati “veramente” di 4 cifre. Bisogna invece escludere, per la prima cifra, la scelta dello 0, lasciando solo 9 scelte disponibili. Poi, nelle cifre successive, lo 0 è ammesso, poiché un numero come ad esempio 1000 è comunque di 4 cifre. Allora, la soluzione corretta è:

$$9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9 \cdot 10^3 = 9000$$

2. Anche in questo caso, la prima cifra deve essere scelta tra  $\{1, 2, \dots, 9\}$ , cioè tra 9 opzioni. Per la seconda cifra, invece, viene esclusa dalle opzioni quella scelta come prima cifra (al fine di evitare le ripetizioni), ma in compenso è ammesso lo 0, quindi il numero di opzioni è ancora 9. Le ultime due cifre, invece, vengono scelte rispettivamente tra 8 e 7 opzioni, sempre per evitare le ripetizioni.

In sintesi, una volta scelta la prima cifra, il numero di modi per scegliere le restanti 3 è dato dalle disposizioni semplici  $D_{9,3} = 9 \cdot 8 \cdot 7$ . Di conseguenza, ci sono complessivamente

$$9 \cdot D_{9,3} = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$$

numeri di 4 cifre non ripetute.

3. Non essendo ammesse le ripetizioni, fissare l’ultima cifra a 0 esclude automaticamente tale opzione dalla scelta della prima cifra, eliminando già la possibilità di ottenere un numero “troppo corto”. Allora, le prime tre cifre possono essere scelte (dall’insieme  $\{1, 2, \dots, 9\}$ ) in

$$D_{9,3} = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$$

modi.

## 5.2 Libri su uno scaffale

*Problema:* Si sistemano su uno scaffale 4 libri di matematica, 6 di fisica e 2 di chimica. Contare quante sistemazioni sono possibili se

1. i libri di ciascuna materia devono stare insieme;
2. solo i libri di matematica devono stare insieme.

*Soluzioni:*

1. Innanzitutto, si sceglie l’ordine delle materie sullo scaffale, ottenendo  $3!$  possibili permutazioni. Poi, per ciascuna di esse, si considerano le permutazioni dei libri all’interno del “blocco” di ogni materia, che sono:

- $4!$  per matematica;
- $6!$  per fisica;
- $2!$  per chimica.

Allora, complessivamente, il numero di sistemazioni possibili è:

$$3! 4! 6! 2! = 207360$$

2. Inizialmente, si considerano i libri di matematica come un blocco unico, e si determinano tutte le sistemazioni di tale blocco insieme agli altri libri  $6 + 2 = 8$  libri, ovvero tutte le permutazioni di 9 elementi, che sono  $9!$ . Rimangono poi da calcolare le permutazioni dei libri di matematica, che, come già visto, sono  $4!$ . In questo caso, il numero di sistemazioni possibili è quindi:

$$9! 4! = 8709120$$

Lo stesso risultato può essere ottenuto con un ragionamento leggermente diverso. Per prima cosa, si sceglie la posizione del blocco di matematica rispetto agli altri libri: ciò può essere fatto in 9 modi diversi (prima di ciascuno degli altri 8 libri, oppure per ultimo). Successivamente, si ricava il numero di permutazioni

- dei libri di matematica:  $4!$ ;
- degli altri libri (situati “intorno” a quelli di matematica):  $8!$ .

La soluzione ottenuta è perciò

$$9 \cdot 8! 4! = 9! 4! = 8709120$$

che è uguale, appunto, a quella ottenuta con il metodo precedente.

### 5.3 Palline colorate in fila

*Problema:* 5 palline rosse, 2 bianche e 3 azzurre devono essere sistemate in fila. Se tutte le palline dello stesso colore sono indistinguibili, quante sistemazioni sono possibili?

Le permutazioni di tutte le palline sono  $(5+2+3)! = 10!$ . Tra queste, sono indistinguibili quelle in cui cambia solo l'ordine di palline degli stessi colori: siccome esistono

- $5!$  permutazioni delle palline rosse,
- $2!$  permutazioni delle palline bianche,
- $3!$  permutazioni delle palline azzurre,

il numero di sistemazioni distinte è:

$$\frac{10!}{5! 2! 3!} = 2520$$

## 5.4 Raggruppamento di 10 oggetti

*Problema:* Quanti sono i modo di dividere 10 oggetti in due gruppi, rispettivamente di 4 e 6 oggetti?

Se  $A$  è l'insieme dei 10 oggetti, ciascun raggruppamento di questo tipo può essere rappresentato da una coppia di insiemi  $(G_4, G_6)$ , tali che

$$\begin{aligned}G_4, G_6 &\subset A \\ \# G_4 &= 4 \\ \# G_6 &= 6\end{aligned}$$

Siccome uno stesso oggetto non può appartenere a entrambi i gruppi ( $G_4 \cap G_6 = \emptyset$ ), e i due gruppi contengono complessivamente tutti gli oggetti ( $G_4 \cup G_6 = A$ ), una volta scelti gli oggetti di un gruppo, quelli che compongono l'altro gruppo sono per forza tutti i rimanenti: ad esempio, se si scelgono gli oggetti da inserire in  $G_4$ , il gruppo  $G_6$  può essere formato solo dai 6 oggetti rimasti. Perciò, il numero modi di formare questi due gruppi è uguale al numero di modi di costruire solo il gruppo da 4 (o, equivalentemente, quello da 6<sup>2</sup>), cioè:

$$C_{10,4} = \binom{10}{4} = \frac{10!}{6!4!} = 210$$

## 5.5 Parole di 5 lettere

*Problema:* Quante parole (anche senza significato) di 3 diverse consonanti e 2 diverse vocali si possono formare con l'alfabeto di 21 lettere (16 consonanti e 5 vocali)?

Per prima cosa, si scelgono le lettere da usare per formare la parola: ci sono

- $C_{16,3}$  modi di scegliere le consonanti;
- $C_{5,2}$  modi di scegliere le vocali.

Poi, si stabilisce l'ordine delle lettere scelte nella parola, che significa considerare le  $(3 + 2)! = 5!$  permutazioni (tutte distinguibili, in quanto non ci sono lettere ripetute). Allora, il numero di parole che si possono formare è:

$$\binom{16}{3} \binom{5}{2} \cdot 5! = \frac{16!}{13!3!} \cdot \frac{5!}{3!2!} \cdot 5! = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14}{3!} \cdot \frac{5 \cdot 4}{2!} \cdot 5! = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 4}{2} = 672000$$

---

<sup>2</sup>In generale, per le combinazioni, vale la proprietà  $C_{n,k} = C_{n,n-k}$ , (in questo caso,  $C_{10,4} = C_{10,10-4} = C_{10,6}$ ), perché determinare quali  $k$  elementi (dell'insieme di  $n$ ) includere in un sottoinsieme è equivalente a determinare quali siano gli  $n - k$  da escludere.